



COOASGO

NUTRIÇÃO ANIMAL

**RAÇÕES, PROTEINADOS E
SUPLEMENTOS MINERAIS**



**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**



SUMÁRIO	PÁG.
RAÇÕES	03
Ração COOASGO Confinamento A Pasto 14%	04
Ração COOASGO Corte 16%	05
Ração COOASGO Corte 18%	06
Ração COOASGO Leite 18%	07
Ração COOASGO Leite 20%	08
Ração COOASGO Leite 22%	09
Ração COOASGO Desmama	10
Ração COOASGO Equinos	11
Ração COOASGO Ovinos	12
Ração COOASGO Grano Entero Baby	13
Ração COOASGO Grano Entero Engorda	14
PROTEINADOS	15
Proteinado COOASGO 22M	16
Proteinado COOASGO 25	17
Proteinado COOASGO 25M	18
Proteinado COOASGO 30M	19
Proteinado COOASGO 35	20
Proteinado COOASGO 35M	21
Proteinado COOASGO 45M	22
SUPLEMENTOS MINERAIS	23
Nutriboi COOASGO	24
Nutricia COOASGO	25
COOASGO Cria	26
COOASGO Recria	27
COOASGO Reprodução	28
COOASGO Engorda	29
COOASGO Leite	30

**CONHEÇA TODAS AS NOSSAS
LINHAS DE RAÇÕES, PROTEINADOS
E SUPLEMENTOS MINERAIS.**

RAÇÕES

Nutrição Animal
COOASGO

COOASGO
Aqui você vale + o ano todo!

Somos o
cooperativismo
no Brasil
somos **coop**

PESO LÍQUIDO: 30kg

RAÇÃO COOASGO CONFINAMENTO A PASTO 14%

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	140,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	36,50 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	780,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	35,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	10,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	16,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	3.500,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.300,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	4.700,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.000,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	1.400,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	6,80 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	0,51 mg/kg
Iodo (Mínimo):	0,77 mg/kg
Manganês (Mínimo):	8,50 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,15 mg/kg
Zinco (Mínimo):	35,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	2.550,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	850,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	17,00 UI/kg
Vitamina B12 (Mínimo):	0,85 mcg/kg
Niacina (Mínimo):	34,00 mg/kg
Ácido Pantotênico (Mínimo):	1,33 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	39,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	5,00 mg/kg

Indicado para bovinos em fase de engorda.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso para bovinos de corte. Fazer adaptação da seguinte forma:

Na primeira semana de uso, fornecer 0,5% de peso vivo/dia; na segunda semana, fornecer 0,75% do peso vivo/dia; na terceira semana, fornecer 1% de peso vivo/dia; na quarta semana, fornecer 2% do peso vivo, em dois tratamentos diários, sempre no mesmo horário. Fornecer em cochos cobertos e/ou com sistema que evite o acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto.

Não fornecer a Equideos, contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados e procurar um profissional de sua confiança em caso de intoxicação.

Espaçamento de cocho de 45cm por animal.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BOVINOS DE CORTE

RAÇÃO COOASGO CORTE 16%

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	160,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	62,80 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	750,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	30,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	15,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	25,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	3.800,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	5.500,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.200,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	2.000,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	10,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	0,75 mg/kg
Iodo (Mínimo):	1,10 mg/kg
Manganês (Mínimo):	12,50 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,22 mg/kg
Zinco (Mínimo):	50,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	3.750,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	1.250,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	25,00 UI/kg
Vitamina B12 (Mínimo):	1,25 mcg/kg
Niacina (Mínimo):	50,00 mg/kg
Ácido Pantotênico (Mínimo):	1,95 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	57,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	7,00 mg/kg

Indicado para bovinos em fase de engorda.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso para bovinos de corte. Fazer adaptação da seguinte forma:

Na primeira semana de uso, fornecer 0,5% de peso vivo/dia; na segunda semana, fornecer 0,75% do peso vivo/dia; na terceira semana fornecer 1% a 1,2% de peso vivo/dia.

Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto.

Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados e procurar um profissional de sua confiança em caso de intoxicação.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BOVINOS DE CORTE

COOASGO
Aqui você vale + o ano todo!

Somos a
cooperação
de todos
somoscoop

PESO LÍQUIDO: 30kg

RAÇÃO COOASGO CORTE 18%

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	180,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	55,00 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	750,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	30,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	10,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	20,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	4.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	5.500,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.200,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	2.000,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	10,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	0,75 mg/kg
Iodo (Mínimo):	1,10 mg/kg
Manganês (Mínimo):	12,50 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,22 mg/kg
Zinco (Mínimo):	50,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	3.750,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	1.250,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	25,00 UI/kg
Vitamina B12 (Mínimo):	1,25 mcg/kg
Niacina (Mínimo):	50,00 mg/kg
Ácido Pantotênico (Mínimo):	1,95 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	57,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	7,00 mg/kg

Indicado para bovinos em fase de engorda.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso para bovinos de corte. Fazer adaptação da seguinte forma:

Na primeira semana de uso, fornecer 0,5% de peso vivo/dia; na segunda semana, fornecer 0,75% do peso vivo/dia; na terceira semana fornecer 1% a 1,2% de peso vivo/dia.

Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água.

Manter boa disponibilidade de pasto.

Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados e procurar um profissional de sua confiança em caso de intoxicação.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BOVINOS DE CORTE

RAÇÃO COOASGO LEITE 18%

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	180,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	42,10 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	750,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	30,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	12,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	17,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	4.500,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	5.500,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	2.400,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	13,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	2,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	1,50 mg/kg
Manganês (Mínimo):	24,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,50 mg/kg
Zinco (Mínimo):	60,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	5.600,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	1.130,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	36,00 UI/kg
Biotina (Mínimo):	1,20 mg/kg
Niacina (Mínimo):	60,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	30,00 mg/kg

Indicado para bovinos de leite no período de lactação.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Fornecer na proporção de 1kg de ração para cada 3kg de leite produzido. Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica. Espaçamento de cocho de 45cm por animal.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BOVINOS DE LEITE

PESO LÍQUIDO: 30kg

RAÇÃO COOASGO LEITE 20%

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	200,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	42,10 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	750,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	30,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	12,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	17,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	4.700,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	6.000,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	2.400,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	13,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	2,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	1,50 mg/kg
Manganês (Mínimo):	24,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,50 mg/kg
Zinco (Mínimo):	60,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	5.600,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	1.130,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	36,00 UI/kg
Biotina (Mínimo):	1,20 mg/kg
Niacina (Mínimo):	60,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	30,00 mg/kg

Indicado para bovinos de leite no período de lactação.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Fornecer na proporção de 1kg de ração para cada 3kg de leite produzido. Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica. Espaçamento de cocho de 45cm por animal.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BOVINOS DE LEITE

RAÇÃO COOASGO LEITE 22%

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	220,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	42,10 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	750,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	30,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	12,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	17,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	6.500,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	2.400,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	13,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	2,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	1,50 mg/kg
Manganês (Mínimo):	24,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,50 mg/kg
Zinco (Mínimo):	60,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	5.600,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	1.130,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	36,00 UI/kg
Biotina (Mínimo):	1,20 mg/kg
Niacina (Mínimo):	60,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	30,00 mg/kg

Indicado para bovinos de leite no período de lactação.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Fornecer na proporção de 1kg de ração para cada 3kg de leite produzido. Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica. Espaçamento de cocho de 45cm por animal.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BOVINOS DE LEITE

RAÇÃO COOASGO DESMAMA

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	180,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	56,00 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	750,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	30,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	10,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	16,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	5.300,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	1.600,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	30,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	4,60 mg/kg
Iodo (Mínimo):	3,90 mg/kg
Manganês (Mínimo):	60,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,68 mg/kg
Zinco (Mínimo):	72,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	7.500,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	1.500,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	75,00 UI/kg
Vitamina B2 (Mínimo):	2,00 mg/kg
Vitamina B6 (Mínimo):	1,50 mg/kg
Vitamina B12 (Mínimo):	11,40 mcg/kg
Vitamina K3 (Mínimo):	1,20 mg/kg
Niacina (Mínimo):	15,00 mg/kg
Biotina (Mínimo):	9,00 mg/kg
Ácido Fólico (Mínimo):	0,30 mg/kg
Ácido Pantotênico (Mínimo):	10,50 mg/kg
Colina (Mínimo):	210,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	36,00 mg/kg

Indicado para bezerros a partir da 2ª semana de vida até a desmama. Sacaria de 30kg, a granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve-se fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: Nos primeiros 3 dias, fornecer 30% do produto, a partir do quarto dia, aumentar gradativamente até o animal consumir na proporção de 80g para cada 100kg do Peso Vivo.

Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Não fornecer a Equideos, contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e/ou debilitados e procurar um profissional de sua confiança em caso de intoxicação.

Espaçamento de cocho de 45cm.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BEZERROS

RAÇÃO COOASGO CREEP

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	120,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	190,00 g/kg
NDT Estimado (Máximo):	760,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	35,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	9,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	14,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.700,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	7.500,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	1.600,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	30,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	4,60 mg/kg
Iodo (Mínimo):	3,90 mg/kg
Manganês (Mínimo):	60,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,68 mg/kg
Zinco (Mínimo):	72,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	7.500,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	1.500,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	75,00 UI/kg
Vitamina B2 (Mínimo):	2,00 mg/kg
Vitamina B6 (Mínimo):	1,50 mg/kg
Vitamina B12 (Mínimo):	11,40 mcg/kg
Vitamina K3 (Mínimo):	1,20 mg/kg
Niacina (Mínimo):	15,00 mg/kg
Biotina (Mínimo):	9,00 mg/kg
Ácido Fólico (Mínimo):	0,30 mg/kg
Ácido Pantotênico (Mínimo):	10,50 mg/kg
Colina (Mínimo):	210,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	36,00 mg/kg

Indicado para bezerros a partir da 2ª semana de vida até a desmama. Sacaria de 30kg, a granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve-se fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: Nos primeiros 3 dias, fornecer 30% do produto, a partir do quarto dia, aumentar gradativamente até o animal consumir na proporção de 80g para cada 100kg do Peso Vivo.

Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto.

Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e/ou debilitados e procurar um profissional de sua confiança em caso de intoxicação.

Espaçamento de cocho de 45cm.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BEZERROS

RAÇÃO COOASGO EQUINOS

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	140,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	140,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	15,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral:	120,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	15,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Fósforo (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.000,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.900,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	27 mg/kg
Iodo (Mínimo):	2,0 mg/kg
Manganês (Mínimo):	55,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	4,00 g/kg
Cobalto (Mínimo):	0,30 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,30 mg/kg
Zinco (Mínimo):	1,10 mg/kg
Metionina (Mínimo):	900,00 mg/kg
Lisina:	4.320,00 mg/kg
NDT Estimado (Mínimo):	698,00 g/kg

Indicado para manutenção de Equinos de Trabalho.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Fornecer na proporção de 1,5% do peso vivo do animal de acordo com o trabalho realizado.

Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água.

Manter boa disponibilidade de pasto.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO
PARA EQUINOS.

RAÇÃO COOASGO OVINOS

Níveis de garantia por KG de produto:

Umidade (Máximo):	140,00 g/kg
Proteína Bruta (Mínimo):	170,00 g/kg
NNP equiv. Proteína:	39,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	15,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral:	120,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	17,5 g/kg
Cálcio (Mínimo):	7.400,00 mg/kg
Fósforo (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.000,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	6.000.00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500.00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	20 mg/kg
Iodo (Mínimo):	1,5 mg/kg
Manganês (Mínimo):	70,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	0,55 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,70 mg/kg
Zinco (Mínimo):	135,00 mg/kg
NDT Estimado (Mínimo):	720,00 g/kg

Indicado para ovinos em fase de crescimento e engorda.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Fornecer na proporção de 1% do peso vivo animal/dia, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água.

Manter boa disponibilidade de pasto.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e/ou debilitados e procurar um profissional de sua confiança em caso de intoxicação.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
OVINOS EM
REGIME DE PASTO.

PESO LÍQUIDO: 30kg

RAÇÃO COOASGO GRÃO ENTERO BABY

Níveis de garantia por KG de produto:

Proteína Bruta (Mínimo):	125,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	10,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	25,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Umidade (Máximo):	130,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	4.000,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	8.000,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	3.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	3.800,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	1.200,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	24,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	0,67 mg/kg
Cromo (Mínimo):	0,45 mg/kg
Iodo (Mínimo):	0,67 mg/kg
Manganês (Mínimo):	24,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,24 mg/kg
Zinco (Mínimo):	54,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	2.700,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	670,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	20,00 UI/kg
Amilase (Mínimo):	33,75 u/kg
Celulase (Mínimo):	100,00 u/kg
Xylanase (Mínimo):	1.350,00 u/kg
B-glucanase (Mínimo):	33,75 u/kg
Protease (Mínimo):	13,50 u/kg
Colina (Mínimo):	13,50 mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mínimo):	3,0 10x10 ⁹ UFC/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	20,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	2,70 mg/kg

Indicado para bezerras a partir da 2ª semana de vida até a desmama. Sacaria de 30kg, a granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Fazer adaptação de, no mínimo, 15 dias antes da troca total da dieta. Essa adaptação é necessária para que o animal faça a troca progressiva de uma dieta rica em celulose para outra rica em amido. Neste período será necessário fornecer forragem aos animais, seja na forma de pasto, capim picado, feno ou bagaço de cana em quantidades decrescentes, associada a introdução da dieta de grão inteiro, podendo ser feita da seguinte forma:

Fornecer do 1º ao 5º dia, 1% do peso corporal da mistura forragem no cocho (ou 8 horas no pasto); Do 6º ao 10º dia, fornecer 1,5% do peso corporal da mistura + forragem no cocho (ou 4 horas de pasto); Do 11º dia ao 15º dia, fornecer 1,8% do peso corporal da mistura + forragem no cocho (ou 2 horas no pasto); Do 16º em diante, fornecer a mistura a vontade no cocho (sem acesso a forragem). Consumo estimado por volta de 2% do peso corporal.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BEZERROS

Somos
somos **coop**

PESO LÍQUIDO: 30kg

RAÇÃO COOASGO GRANO ENTERO ENGORDA

Níveis de garantia por KG de produto:

Proteína Bruta (Mínimo):	120,00 g/kg
NNP equiv. Proteína (Máximo):	17,00 g/kg
Extrato Etéreo (Mínimo):	30,00 g/kg
Fibra Bruta (Máximo):	100,00 g/kg
FDA (Máximo):	100,00 g/kg
Matéria Mineral (Máximo):	120,00 g/kg
Umidade (Máximo):	130,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	4.000,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	8.000,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	3.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Potássio (Mínimo):	3.800,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.500,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	1.200,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	24,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	0,67 mg/kg
Cromo (Mínimo):	0,45 mg/kg
Iodo (Mínimo):	0,67 mg/kg
Manganês (Mínimo):	24,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,24 mg/kg
Zinco (Mínimo):	54,00 mg/kg
Vitamina A (Mínimo):	2.700,00 UI/kg
Vitamina D3 (Mínimo):	670,00 UI/kg
Vitamina E (Mínimo):	20,00 UI/kg
Amilase (Mínimo):	33,75 u/kg
Celulase (Mínimo):	100,00 u/kg
Xylanase (Mínimo):	1.350,00 u/kg
B-glucanase (Mínimo):	33,75 u/kg
Protease (Mínimo):	13,50 u/kg
Colina (Mínimo):	13,50 mg/kg
Saccharomyces cerevisiae (Mínimo):	3,0 10x10 ⁹ UFC/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	20,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	2,70 mg/kg

Indicado para bovinos em fase de recria e engorda.
Sacaria de 30kg, a granel e Big Bag.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Fazer adaptação de, no mínimo, 15 dias antes da troca total da dieta. Essa adaptação é necessária para que o animal faça a troca progressiva de uma dieta rica em celulose para outra rica em amido. Neste período será necessário fornecer forragem aos animais, seja na forma de pasto, capim picado, feno ou bagaço de cana em quantidades decrescentes, associada a introdução da dieta de grão inteiro, podendo ser feita da seguinte forma:

Fornecer do 1º ao 5º dia, 1% do peso corporal da mistura forragem no cocho (ou 8 horas no pasto); Do 6º ao 10º dia, fornecer 1,5% do peso corporal da mistura + forragem no cocho (ou 4 horas de pasto); Do 11º dia ao 15º dia, fornecer 1,8% do peso corporal da mistura + forragem no cocho (ou 2 horas no pasto); Do 16º em diante, fornecer a mistura a vontade no cocho (sem acesso a forragem). Consumo estimado por volta de 2% do peso corporal.

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.



RAÇÃO PARA
BOVINOS EM FASE
DE ENGORDA E
TERMINAÇÃO.

PROTEINADOS



PROTEINADO COOASGO 22M (0,5%)

Indicado para bovinos em fase de recria e engorda durante o ano todo.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Níveis de garantia por KG de produto:

	FÓRMULA ÁGUA	FÓRMULA SECA
Proteína Bruta (Mínimo):	220,00 g/kg	220,00 g/kg
NNP - Equiv. Proteico (Máximo):	110,00 g/kg	136,00 g/kg
NDT Estimado (Mínimo):	650,00 g/kg	650,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	20,00 g/kg	20,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	40,00 g/kg	40,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	6.000,00 mg/kg	6.000,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.000,00 mg/kg	1.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	2.000,00 mg/kg	2.000,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	9.000,00 mg/kg	12,90 g/kg
Cobre (Mínimo):	40,00 mg/kg	40,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	1,25 mg/kg	1,25 mg/kg
Ferro (Mínimo):	25,00 mg/kg	25,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	2,25 mg/kg	2,25 mg/kg
Manganês (Mínimo):	60,00 mg/kg	60,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	0,63 mg/kg	0,63 mg/kg
Zinco (Mínimo):	135,00 mg/kg	135,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	0,75 mg/kg	0,75 mg/kg
Flúor (Máximo):	60,00 mg/kg	60,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	50,00 mg/kg	50,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	5,00 mg/kg	5,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Deve-se fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: Nos Primeiros 3 dias, suplementar com 25% do produto e 75% de sal mineral usado na propriedade; no quarto dia, fornecer 50% do produto com 50% de sal mineral. A partir do sétimo dia, fornecer 75% do produto e 25% de sal mineral e finalmente no décimo dia de adaptação, fornecer o produto puro na proporção de 500g para cada 100kg/PV. Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica. Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados. Em caso de intoxicação, procurar um profissional de sua confiança. Espaçamento de cocho de 45cm por animal.



SUPLEMENTO
MINERAL PROTEICO
DE PRONTO USO
PARA BOVINOS.

PROTEINADO COOASGO 25 (0,3%)

Indicado para bovinos de corte em fase de recria e engorda.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Níveis de garantia por KG de produto:

	FÓRMULA ÁGUA	FÓRMULA SECA
Proteína Bruta (mínimo):	250,00 g/kg	250,00 g/kg
NNP - Equiv. Proteico (Máximo):	140,00 g/kg	150,00 g/kg
NDT Estimado (Mínimo):	600,00 g/kg	600,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	60,00 g/kg	60,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	40,00 g/kg	40,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	8.000,00 mg/kg	8.000,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.200,00 mg/kg	1.200,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	3.200,00 mg/kg	3.200,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	18,00 g/kg	27,00 g/kg
Cobre (Mínimo):	64,00 mg/kg	64,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	2,00 mg/kg	2,00 mg/kg
Ferro (Mínimo):	40,00 mg/kg	40,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	3,60 mg/kg	3,60 mg/kg
Manganês (Mínimo):	96,00 mg/kg	96,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	1,00 mg/kg	1,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	216,00 mg/kg	216,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	1,20 mg/kg	1,20 mg/kg
Flúor (Máximo):	80,00 mg/kg	80,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Deve-se fazer adaptação dos animais da seguinte forma: Nos primeiros 3 dias, suplementar com 25% do produto e 75% de sal mineral da propriedade, no quarto dia, oferecer 50% do produto e 50% de sal mineral. A partir do sétimo dia, fornecer 75% do produto e 25% de sal mineral e finalmente no décimo dia de adaptação, fornecer o produto puro na proporção de 300g para cada 100kg/PV. Fornecer diariamente sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água.

Manter boa disponibilidade de pasto.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados. Em caso de intoxicação, procurar um profissional de sua confiança.

Espaçamento de cocho de 25cm por animal.

Nutrição Animal
COOASGO



COOASGO

Aquí você vale + o ano todo!

Somos a
cooperativa
do Brasil
somoscoop

PESO LÍQUIDO: 30kg

SUPLEMENTO
MINERAL PROTEICO
DE PRONTO USO
PARA BOVINOS.

PROTEINADO COOASGO 25M (0,3%)

Indicado para bovinos em fase de recria e engorda durante o ano todo.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Níveis de garantia por KG de produto:

	FÓRMULA ÁGUA	FÓRMULA SECA
Proteína Bruta (Mínimo):	250,00 g/kg	250,00 g/kg
NNP - Equiv. Proteico (Máximo):	140,00 g/kg	150,00 g/kg
NDT Estimado (Mínimo):	600,00 g/kg	600,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	60,00 g/kg	60,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	40,00 g/kg	40,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	8.000,00 mg/kg	8.000,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	1.200,00 mg/kg	1.200,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	3.200,00 mg/kg	3.200,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	18,00 g/kg	27,00 g/kg
Cobre (Mínimo):	64,00 mg/kg	64,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	2,00 mg/kg	2,00 mg/kg
Ferro (Mínimo):	40,00 mg/kg	40,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	3,60 mg/kg	3,60 mg/kg
Manganês (Mínimo):	96,00 mg/kg	96,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	1,00 mg/kg	1,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	216,00 mg/kg	216,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	1,20 mg/kg	1,20 mg/kg
Flúor (Máximo):	80,00 mg/kg	80,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	80,00 mg/kg	80,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	8,00 mg/kg	8,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Deve-se fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: Nos primeiros 3 dias suplementar com 25% do produto e 75% de sal mineral usado na propriedade; no quarto dia, oferecer 50% do produto e 50% de sal mineral.

A partir do sétimo dia, fornecer 75% do produto e 25% de sal mineral e finalmente no décimo dia de adaptação, fornecer o produto puro na proporção de 300g para cada 100kg/PV. Fornecer diariamente sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boas disponibilidade de pasto.

Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados. Em caso de intoxicação, procurar um profissional de sua confiança.



SUPLEMENTO
MINERAL PROTEICO
DE PRONTO USO
PARA BOVINOS.

PESO LÍQUIDO: 30kg

PROTEINADO COOASGO 30M (0,2%)

Indicado para bovinos em fase de recria e engorda durante o ano todo.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Níveis de garantia por KG de produto:

	FÓRMULA ÁGUA	FÓRMULA SECA
Proteína Bruta (Mínimo):	300,00 g/kg	300,00 g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máximo):	191,00 g/kg	206,00 g/kg
NDT Estimado (Mínimo):	450,00 g/kg	450,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	60,00 g/kg	60,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	40,00 g/kg	40,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	9.000,00 mg/kg	9.000,00 mg/kg
Magnésio (Mínimo):	2.000,00 mg/kg	2.000,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	4.000,00 g/kg	4.000,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	55,00 g/kg	64,00 g/kg
Cobre (Mínimo):	80,00 mg/kg	80,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	2,50 mg/kg	2,50 mg/kg
Ferro (Mínimo):	50,00 mg/kg	50,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	4,50 mg/kg	4,50 mg/kg
Manganês (Mínimo):	120,00 mg/kg	120,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	1,25 mg/kg	1,25 mg/kg
Zinco (Mínimo):	270,00 mg/kg	270,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	1,50 mg/kg	1,50 mg/kg
Flúor (Máximo):	90,00 mg/kg	90,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	100,00 mg/kg	100,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	10,00 mg/kg	10,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Deve-se fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: Nos primeiros 3 dias fornecer 30% do produto com 70% de sal mineral usado na propriedade; no quarto dia faz-se a inversão, fornece 70% do produto com 30% de sal mineral por 3 dias; no sétimo dia de adaptação pode fornecer o produto puro. Fornecer na proporção de 200g para cada 100kg/PV.

Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Não fornecer a Equídeos, contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados e procurar profissional de sua confiança em caso de intoxicação.

Espaçamento do cocho de 20cm por animal.



SUPLEMENTO
MINERAL PROTEICO
DE PRONTO USO
PARA BOVINOS.

PROTEINADO COOASGO 35 (0,1%)

Indicado para bovinos de corte em fase de recria e engorda.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Níveis de garantia por KG de produto:

	FÓRMULA ÁGUA	FÓRMULA SECA
Proteína Bruta (mínimo):	350,00 g/kg	350,00 g/kg
NNP – Equiv. Proteico (Máximo):	245,00 g/kg	267,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	60,00 g/kg	60,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	40,00 g/kg	40,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	14,00 g/kg	14,00 g/kg
Magnésio (Mínimo):	2.500,00 mg/kg	2.500,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	8.000,00 mg/kg	8.000,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	74,00 g/kg	92,00 g/kg
Cobre (Mínimo):	160,00 mg/kg	160,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	5,00 mg/kg	5,00 mg/kg
Ferro (Mínimo):	100,00 mg/kg	100,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	9,00 mg/kg	9,00 mg/kg
Manganês (Mínimo):	240,00 mg/kg	240,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	2,50 mg/kg	2,50 mg/kg
Zinco (Mínimo):	540,00 mg/kg	540,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	3,00 mg/kg	3,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	140,00 mg/kg	140,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva sobre estrados ventilados.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Basta abrir o saco e despejar o produto no cocho, deixando à vontade para consumo dos animais. A faixa estimada de consumo é de 100g para cada 100kg de peso corporal. ESTE PRODUTO CONTÉM URÉIA. Necessita de adaptação: Na primeira semana de uso, o produto deve ser misturado ao suplemento mineral na proporção de 1:1 para adaptação dos animais. Fornecer em cochos cobertos e/ou que evitem acúmulo de água.

Manter boa disponibilidade de pasto.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados. Em caso de intoxicação, procurar um profissional habilitado.



SUPLEMENTO
MINERAL PROTEICO
DE PRONTO USO.

PROTEINADO COOASGO 35M (0,1%)

Indicado para bovinos em fase de recria e engorda durante o ano todo.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Níveis de garantia por KG de produto:

	FÓRMULA ÁGUA	FÓRMULA SECA
Proteína Bruta (Mínimo):	350,00 g/kg	350,00 g/kg
NNP - Equiv. Proteico (Máximo):	245,00 g/kg	267,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	60,00 g/kg	60,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	40,00 g/kg	40,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	14,00 g/kg	14,00 g/kg
Magnésio (Mínimo):	2.500,00 mg/kg	2.500,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	8.000,00 mg/kg	8.000,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	74,00 g/kg	92,00 g/kg
Cobre (Mínimo):	160,00 mg/kg	160,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	5,00 mg/kg	5,00 mg/kg
Ferro (Mínimo):	100,00 mg/kg	100,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	9,00 mg/kg	9,00 mg/kg
Manganês (Mínimo):	240,00 mg/kg	240,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	2,50 mg/kg	2,50 mg/kg
Zinco (Mínimo):	540,00 mg/kg	540,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	3,00 mg/kg	3,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	140,00 mg/kg	140,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	200,00 mg/kg	200,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	20,00 mg/kg	20,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva
sobre estrados ventilados.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Deve-se fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: Primeiros 3 dias, oferecer 30% do produto e 70% de sal mineral usado na propriedade; no quarto dia, faz-se a inversão; fornecer 70% do produto com 30% de sal mineral por 3 dias; no sétimo dia de adaptação, pode fornecer o produto puro. Fornecer na proporção de 100g para cada 100kg/PV. Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Não fornecer a Equídeos contém Monensina Sódica. Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados. Em caso de intoxicação, procurar um profissional de confiança. Espaçamento de cocho de 15cm por animal.

SUPLEMENTO
MINERAL PROTEICO
DE PRONTO USO
PARA BOVINOS.



PROTEINADO COOASGO 45M (0,1%)

Indicado para bovinos em fase de recria e engorda durante o ano todo.
Embalagens de 30kg ou Granel e Big Bag.

Níveis de garantia por KG de produto:

	FÓRMULA ÁGUA	FÓRMULA SECA
Proteína Bruta (Mínimo):	450,00 g/kg	450,00 g/kg
NNP - Equiv. Proteico (Máximo):	363,00 g/kg	372,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	60,00 g/kg	60,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	40,00 g/kg	40,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	14,00 g/kg	14,00 g/kg
Magnésio (Mínimo):	2.500,00 mg/kg	2.500,00 mg/kg
Enxofre (Mínimo):	8.000,00 mg/kg	8.000,00 mg/kg
Sódio (Mínimo):	74,00 g/kg	92,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	160,00 mg/kg	160,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	5,00 mg/kg	5,00 mg/kg
Ferro (Mínimo):	100,00 mg/kg	100,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	9,00 mg/kg	9,00 mg/kg
Manganês (Mínimo):	240,00 mg/kg	240,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	2,50 mg/kg	2,50 mg/kg
Zinco (Mínimo):	540,00 mg/kg	540,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	3,00 mg/kg	3,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	140,00 mg/kg	140,00 mg/kg
Monensina Sódica (Mínimo):	200,00 mg/kg	200,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	20,00 mg/kg	20,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Conservar ao abrigo de sol e chuva
sobre estrados ventilados.

Modo de Usar:

Produto pronto para uso. Deve-se fazer a adaptação dos animais da seguinte forma: Primeiros 3 dias, oferecer 30% do produto e 70% de sal mineral usado na propriedade; no quarto dia, faz-se a inversão; fornecer 70% do produto com 30% de sal mineral por 3 dias; no sétimo dia de adaptação, pode fornecer o produto puro. Fornecer na proporção de 100g para cada 100kg/PV. Fornecer diariamente, sempre que possível no mesmo horário, em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto. Não fornecer a Equideos contém Monensina Sódica.

Não fornecer a animais em jejum, famintos e debilitados. Em caso de intoxicação, procurar um profissional de confiança.

Espaçamento de cocho de 15cm por animal.



SUPLEMENTO
MINERAL PROTEICO
DE PRONTO USO
PARA BOVINOS.

SUPLEMENTOS MINERAIS



NUTRIBOI COOASGO

Níveis de garantia por KG de produto:

Proteína Bruta (Mínimo):	135,00 g/kg
NNP equiv. Proteína:	130,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	160,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	200,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	30,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	85,00 g/kg
Enxofre (Mínimo):	10,00 g/kg
Magnésio (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	40,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	670,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	15,00 mg/kg
Ferro (Mínimo):	400,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	35,00 mg/kg
Manganês (Mínimo):	550,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	9,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	2.000,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	300,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	120,00 mg/kg
Sacch. Cerevisiae (Mínimo):	3,75 x 10 ⁸ UFC/kg

Modo de Conservação:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente seco, fresco, ao abrigo de raios solares e sobre estrados. Transportar com cuidado.

Suplemento mineral aditivado indicado para bovinos de corte nas fases de recria e engorda durante o ano todo.

Sacaria de 30kg.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve deixar a disposição dos animais em cochos, preferencialmente coberto ou com sistema que evite acúmulo de água.

Este produto contém ureia, devendo portanto, ser feita uma adaptação dos animais.

A faixa recomendada de consumo é de 30 a 50 g/100kg de peso vivo.



SUPLEMENTO
MINERAL ADITIVADO
INDICADO PARA
BOVINOS DE CORTE.

Minerais 30kg

NUTRICRIA COOASGO

Níveis de garantia por KG de produto:

Proteína Bruta (Mínimo):	135,00 g/kg
NNP equiv. Proteína:	130,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	160,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	200,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	40,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	85,00 g/kg
Enxofre (Mínimo):	10,00 g/kg
Magnésio (Mínimo):	5.000,00 mg/kg
Cobalto (Mínimo):	50,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	800,00 mg/kg
Cromo (Mínimo):	15,00 mg/kg
Ferro (Mínimo):	500,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	45,00 mg/kg
Manganês (Mínimo):	700,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	12,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	2.600,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	400,00 mg/kg
Flavomicina (Mínimo):	120,00 mg/kg
Sacch. Cerevisiae (Mínimo):	3,75 x 10 ⁹ UFC/kg

Suplemento mineral aditivado indicado para bovinos de corte nas fases de cria durante o ano todo.

Sacaria de 30kg.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve deixar a disposição dos animais em cochos, preferencialmente coberto ou com sistema que evite acúmulo de água.

Este produto contém ureia, devendo portanto, ser feita uma adaptação dos animais.

A faixa recomendada de consumo é de 30 a 50 g/100kg de peso vivo.

Modo de Conservação:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente seco, fresco, ao abrigo de raios solares e sobre estrados. Transportar com cuidado.



SUPLEMENTO
MINERAL ADITIVADO
INDICADO PARA
BOVINOS DE CORTE.

COOASGO CRIA

Níveis de garantia por KG de produto:

Cálcio (Máximo):	190,00 g/kg
Cálcio (Mínimo):	150,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	80,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	125,00 g/kg
Enxofre (Mínimo):	15,00 g/kg
Cobalto (Mínimo):	80,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	1.200,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	70,00 mg/kg
Mangânês (Mínimo):	1.400,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	18,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	4.000,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	800,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente seco, fresco, ao abrigo de raios solares e sobre estrados. Transportar com cuidado.

Suplemento mineral para bovinos de corte criados a pasto e em fase de cria (reprodução).
Sacaria de 30kg.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve deixar a disposição dos animais em cochos, preferencialmente coberto ou com sistema que evite acúmulo de água. Recomenda-se o consumo de 15 a 20g do produto para cada 100kg de peso do animal.



SUPLEMENTO
MINERAL
INDICADO PARA
BOVINOS DE CORTE.

COOASGO RECRIA

Níveis de garantia por KG de produto:

Cálcio (Mínimo):	150,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	190,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	65,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	133,00 g/kg
Enxofre (Mínimo):	12,00 g/kg
Cobalto (Mínimo):	70,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	1.000,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	60,00 mg/kg
Manganês (Mínimo):	1.200,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	15,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	3.500,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	650,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente seco, fresco, ao abrigo de raios solares e sobre estrados. Transportar com cuidado.

É indicado como suplemento mineral para bovinos de corte criados a pasto e em fase de recria (crescimento).
Sacaria de 30kg.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve deixar a disposição dos animais em cochos, preferencialmente coberto ou com sistema que evite acúmulo de água. Recomenda-se o consumo de 15 a 20g do produto para cada 100kg de peso do animal.



SUPLEMENTO
MINERAL
PARA BOVINOS
DE CORTE.

COOASGO REPRODUÇÃO

Níveis de garantia por KG de produto:

Cálcio (Mínimo):	140,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	180,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	88,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	125,00 g/kg
Enxofre (Mínimo):	15,00 g/kg
Cobalto (Mínimo):	100,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	1.400,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	80,00 mg/kg
Mangânês (Mínimo):	1.600,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	20,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	4.500,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	880,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente seco, fresco, ao abrigo de raios solares e sobre estrados. Transportar com cuidado.

É indicado como suplemento mineral para bovinos de corte criados a pasto e em fase de cria (reprodução).
Sacaria de 30kg.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve deixar a disposição dos animais em cochos, preferencialmente coberto ou com sistema que evite acúmulo de água. Recomenda-se o consumo de 15 a 20g do produto para cada 100kg de peso do animal.



SUPLEMENTO
MINERAL
PARA BOVINOS
DE CORTE.

Minerais 30kg

COOASGO ENGORDA

Níveis de garantia por KG de produto:

Cálcio (Mínimo):	150,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	190,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	40,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	148,00 g/kg
Enxofre (Mínimo):	12,00 g/kg
Cobalto (Mínimo):	50,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	800,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	40,00 mg/kg
Mangânês (Mínimo):	900,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	9,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	2.500,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	400,00 mg/kg

Modo de Conservação:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente seco, fresco, ao abrigo de raios solares e sobre estrados. Transportar com cuidado.

É indicado como suplemento mineral para bovinos de corte criados a pasto e em fase de engorda (terminação).
Sacaria de 30kg.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve deixar a disposição dos animais em cochos, preferencialmente coberto ou com sistema que evite acúmulo de água. Recomenda-se o consumo de 15 a 20g do produto para cada 100kg de peso do animal.



SUPLEMENTO
MINERAL
INDICADO PARA
BOVINOS DE CORTE.

COOASGO LEITE

Níveis de garantia por KG de produto:

Cálcio (Mínimo):	155,00 g/kg
Cálcio (Máximo):	195,00 g/kg
Fósforo (Mínimo):	73,00 g/kg
Sódio (Mínimo):	130,00 g/kg
Enxofre (Mínimo):	16,00 g/kg
Cobalto (Mínimo):	80,00 mg/kg
Cobre (Mínimo):	1.200,00 mg/kg
Iodo (Mínimo):	70,00 mg/kg
Manganês (Mínimo):	1.400,00 mg/kg
Selênio (Mínimo):	18,00 mg/kg
Zinco (Mínimo):	3.500,00 mg/kg
Flúor (Máximo):	730,00 mg/kg
Vitamina A :	100.000,00 UI/kg
Vitamina D3:	10.000,00 UI/kg
Vitamina E:	1.000,00 UI/kg

Modo de Conservação:

Manter o produto na embalagem original, em ambiente seco, fresco, ao abrigo de raios solares e sobre estrados. Transportar com cuidado.

É indicado como suplemento mineral para bovinos de leite criados a pasto e em todas as fases. Sacaria de 30kg.

Modo de Usar:

Produto de pronto uso. Deve deixar a disposição dos animais em cochos, preferencialmente coberto ou com sistema que evite acúmulo de água. Recomenda-se o consumo de 20 a 40g do produto para cada 100kg de peso do animal.



SUPLEMENTO
MINERAL
PARA BOVINOS
DE LEITE.

Nuctramix é tecnologia aliada ao conhecimento de campo



MATRIZ: Chapecó - SC
Rua Alfredo Goelner, 250D
Distrito Industria I Flavio Baldissera
(49) 3323-0486
administrativo@nuctramix.com.br

FILIAL I: Paraíso do Tocantins - TO
Rua 3, S/N, Quadra 05, Mod. 17 a 21
Parque Agroindustrial José de Deus
(63) 3361-7135 | (63) 99917-8055
recepcao.to@nuctramix.com.br

FILIAL II: Várzea Grande - MT
Avenida Mario Andreazza, 1006,
Barracão F | B. Nova Esperança
(65) 3684-0153 | (49) 99189-2834
cuiaba@nuctramix.com.br

FILIAL III: Jardinópolis - SC
Rodovia SC 159, km 26, S/N
Bairro Interior | (49) 3360-4010
fabrica.jdo@nuctramix.com.br



Acesse nosso novo site:
NUCTRAMIX.COM.BR



BOVINOS DE CORTE



BOVINOS DE LEITE



SUÍNOS



AVES



AGUACULTURA



EQUINOS



PET

BR 163, KM 609 - São Gabriel do Oeste - MS

sac: (67) 3295-8000

vendas@cooasgo.com.br

www.cooasgo.com.br